

 **BASF**  
We create chemistry

# Акрис®

Нет сорняков - нет забот!



Наши контакты


[www.agro-by.basf.com](http://www.agro-by.basf.com)





## Преимущества гербицида

- Широкий спектр действия против однодольных и двудольных сорняков.
- Надежная эффективность даже при перепадах влажности почвы.
- Длительное почвенное действие.
- Высокая селективность к кукурузе.
- Два механизма действия - отсутствие резистентности.
- Отсутствие последствия в севообороте.
- Универсальный партнер для широкого спектра послевсходовых гербицидов.



1) Рекомендуемые баковые смеси:

Акрис® 1,5 л/га + никосульфурон 40-60 г д.в./га + мезотрион 100-150 г д.в./га в фазу 1-5 листьев кукурузы

Акрис® 1,5 л/га + мезотрион (480 г/л) 0,2 - 0,3 л/га в фазу 1-3 листьев кукурузы

Акрис® 1,5 л/га + никосульфурон 40-60 г д.в./га в фазу 2-5 листьев кукурузы

Акрис® 1,5 л/га + римсульфурон 10-12 г д.в./га в фазу 2-5 листьев кукурузы

## Характеристика препарата

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Действующие вещества</b><br/>Диметенамид-П (280 г/л) + тербутилазин (250 г/л)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Распределение в растении</b><br/>Системный.</p>                              |
| <p><b>Препаративная форма</b><br/>Суспензионная эмульсия (СЭ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Упаковка</b><br/>2 x 10 л</p>                                                |
| <p><b>Химические группы ДВ</b><br/>Хлорацетамиды + триазины</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Период защитного действия</b><br/>В течение всего вегетационного периода</p> |
| <p><b>Механизм действия (Группа 15+5, HRAC*)</b><br/>Диметенамид-П относится к ингибиторам биосинтеза жирных кислот (ингибиторам клеточного деления). Сорняки погибают до или вскоре после прорастания или после появления всходов. Тербутилазин относится к ингибиторам фотосинтеза, нарушает процесс фиксации CO<sub>2</sub> растением лишая его энергии, вызывает гибель сорняков сразу после прорастания</p> |                                                                                    |

\* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

## Довсходовое применение Акрис®

**Акрис® обеспечил полный контроль сорной растительности даже в условиях недостатка влаги!**  
УО «ГГАУ», Гродненский район. Фото: 31.07.2018г.




Послевсходовый гербицид  
на основе сульфонилмочевин, 1,5 л/га




**Акрис®, 2,5 л/га**  
до всходов

## Надежное действие Акрис® в разных условиях



ОАО «Городилово», Молодечненского района,  
Минской области Акрис®, 2,5 л/га до всходов



КФХ «Днепр-Агро», Будо-Кошелевского района,  
Гомельской области Акрис®, 2,5 л/га до всходов

**Акрис® – универсальная стратегия использования в не зависимости от погодных и почвенных условий**

### ДОВСХОДОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

2,0-2,5 л/га

Основная рекомендуемая норма расхода для легких почв и при условиях достаточного увлажнения.

3,0 л/га

На почвах с тяжелым гранулометрическим составом (>40% глины) и при высоком содержании гумуса.

**Расход рабочей жидкости 200-400 л**

### ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕ ВСХОДОВ

1,5 л/га

**в фазу 1-5 листьев кукурузы**  
+ мезотрион (480 г/л) 0,2 - 0,3 л/га

**в фазу 2-5 листьев кукурузы**  
+ никосульфурон 40-60 г д.в./га  
или  
+ римсульфурон 10-12 г/га д.в.

**в фазу 1-5 листьев кукурузы**  
+ никосульфурон 40-60 г д.в./га  
+ мезотрион 100-150 г д.в./га

*При невозможности довсходового применения или перерастании сорных растений. В условиях экстремальной засухи и отсутствия осадков.*



## Послевсходовое применение Акрис®

**Комби-Эффект проявился на фоне большого количества растительных остатков на почве**  
ОАО «Жеребковичи», Ляховичский район, 11.07.23      АК «Ждановичи», Минский район, 2020 г.



**Акрис® 1,5 л/га + мезотрион 480, 0,2 л/га**  
в фазу 3 листа кукурузы



**Акрис® 1,5 л/га + мезотрион 480 г/л 0,2 л/га**  
в фазу 3 листа кукурузы

## Длительное защитное действие смесей на основе Акрис®, благодаря контролю последующих волн сорняков

СК «ТРАЙПЛ-АГРО», Логойский район. Фото: 2020г.



**Акрис® 1,5 л/га + мезотрион (480 г/л) 0,3 л/га**  
Внесение в 3 листа культуры



**Акрис® 1,5 л/га + мезотрион (480 г/л) 0,3 л/га**  
Вид поля во время уборки

УП «Витебскоблгаз», СХП «Мазоловогаз», Витебский район, 2022 г.



**Акрис® 1,5 л/га + никосульфурон, 40 г/га**  
Внесение в 4 листа кукурузы




**Акрис® 1,5 л/га + никосульфурон, 40 г/га**  
Вид поля после уборки




## Ситуация 2023: применение Акрис® в условиях засухи

Кореличский район: 50 дней без осадков – экстремальные условия для работы почвенного гербицида



**Акрис®** эффективен при наличии минимального количества влаги в почве (6 мм), когда другие почвенные гербициды неэффективны

### Рекомендация по применению Акрис® в условиях засухи



**Акрис® – эффективность в условиях недостатка влаги и жары**

СПК «Жуховичи», Кореличский р-н. Применение **Акрис®** + Пиларлюкс



**Акрис® + мезотрион + никосульфурон: опыт применения 2023 г.**

Акрис® 1,5 л/га + Пиларлюкс 1,0 л/га. Фаза внесения 3 – 5 листьев кукурузы



СПК «Жуховичи», Кореличский р-н



СПК «Прогресс Вертелишки», Гродненский р-н

**Акрис® + Пиларлюкс:** эффективный контроль сорняков при отсутствии влаги более месяца до прополки



## Акрис®: эффективная защита картофеля от сорняков

УО «БГСХА», Горецкий район, Могилевская область



Гербицид Акрис® применяется до всходов картофеля после проведения последнего окучивания в норме 2,5 л/га. При двукратной (поэтапной) системе защиты картофеля Акрис® 2,0 л/га вносится до всходов картофеля, повторную обработку проводят гербицидами римсульфурон, метрибузин по всходам картофеля в соответствии с регламентами применения данных препаратов.



## Применение Акрис® на сое\*

Гербицид Акрис® в однократной системе защиты вносится однократно 2,5 л/га до всходов сои если осадки прогнозируются в ближайшие 5-7 дней до или после применения препарата. Сорные растения не должны перерасти фазу семядолей, злаковые - 1-го листа. Наиболее эффективной системой защиты сои является двукратное применение гербицидов или применение баковых смесей:

1. На связных по гранулометрическому составу почвах однократное применение до всходов Акрис® 1,5 л/га + Пульсар® 1,0 л/га до всходов.
2. Двукратное применение гербицидов оправдано на легких почвах, в засушливую погоду, на почвах с высоким содержанием гумуса (торфяных почвах): Акрис® 1,5 л/га до всходов (1-я обработка), Корум® 1,0 л/га + ПАВ ДАШ® 1,0 л/га (2-я обработка) по следующей волне сорных растений не зависимо от фазы развития сои. Или Акрис® 1,5 л/га до всходов (1-я обработка), Пульсар® Флекс 1,2 л/га (2-я обработка) по следующей волне сорных растений независимо от стадии развития сои.

\* в процессе регистрации в РБ



## Акрис®: эффективная защита сорго и подсолнечника

Гербицид Акрис® – эффективное решение в прополке сорго и подсолнечника не имеет ограничений в севообороте. Акрис® контролирует сорные растения, устойчивые к другим группам гербицидов, а также трудноискоренимые сорняки: вероника, виды герани, виды горца, просо куриное, яснотка пурпурная, паслен, виды ромашки, мятлик однолетний, лисохвост и др. Для активации Акрис® достаточно всего 6 мм осадков.

Акрис® — для прополки сорго и подсолнечника вносится в дозе 2,0 – 2,5 л/га. Максимальную норму внесения стоит выбирать на связных, богатых органическим веществом почвах.

При прополке сорго гербицидом Акрис® допускается единичное наличие всходов культурных растений на поле, сорняки для надежного их контроля не должны перерасти фазу семядолей.

При применении Акрис® на подсолнечнике гербицид вносится строго до всходов.

### Акрис® 2,5 л/га на Сорго

УП «Брестоблгаз» СПУ «Доманово», Ивацевичский район, Брестская область. Фото: 2020г.



### Регистрационные испытания

ГНПЦ НАН Беларуси по Земледелию, г. Жодино. Фото: 2019г.



Акрис®, 2,5 л/га до всходов



Акрис®, 2,0 л/га до всходов

### Акрис® для защиты подсолнечника следует применять почвенно, до всходов культуры

РНДУП «Полесский институт растениеводства», 2021 г.



Контроль




Акрис® 2,0 л/га

## Механизм действия и рекомендации по применению Акрис®

Акрис® действует в основном через почву и одновременно обладает ранней послевсходовой активностью. Подавляет широкий спектр однодольных и двудольных сорняков, в том числе трудноискоренимые и устойчивые к другим группам гербицидов. Диметенамид-П ингибирует деление клеток, а тербутилазин нарушает процесс фиксации CO<sub>2</sub> при фотосинтезе усиливая действие на прорастающие сорные растения.

Обработку следует проводить по выравненной, относительно влажной почве. Если осадки прогнозируются в ближайшие 5-7 дней до или после применения, сорные растения не должны перерастать фазу семядолей, злаковые - 1 листа.




**Выбор нормы расхода** зависит от сроков обработки, типа почвы, содержания гумуса, условий увлажнения и уровня засорения поля и варьируется от 1,5 до 3,0 л/га. **Основная рекомендуемая норма Акрис® в чистом виде довсходово - 2,0 - 2,5 л/га.** Норму расхода увеличивают до 3,0 л/га при высоком содержании гумуса, на тяжелых почвах с содержанием глины более 40%.

Акрис® сохраняет эффективность даже в засушливых условиях благодаря уникальной способности его компонентов к растворению. Препарат также демонстрирует отличный контроль сорняков даже при минимальном количестве влаги — при выпадении 5–6 мм осадков (или всего 10 % почвенной влагоемкости). Кроме того, гербицид способен к реактивации, если необходимое количество осадков выпадет в течение 10 дней после обработки.

## Акрис® - гербицид, обладающий КОМБИ ЭФФЕКТОМ!

Вертикальное распределение действующих веществ в зависимости от влажности почвы и осадков.



Возможность контролировать сорняки как при недостатке осадков так и при переизбытке почвенной влаги



- Прорастающие семена сорняков
- Тербутилазин
- Диметенамид-П

На кукурузе при отсутствии возможности довсходового применения, а также в условиях отсутствия осадков или перерастании сорных растений на момент применения, рекомендуем послевсходовое применение смеси гербицидов в фазу, рекомендуемую для гербицида-партнера:

**Акрис® 1,5 л/га + никосульфурон 40-60 г д.в./га + мезотрион 100-150 г д.в./га в фазу 1-5 листьев кукурузы**

**Акрис® 1,5 л/га + мезотрион (480 г/л) 0,3 л/га в фазу 0,2 - 1-3 листьев кукурузы**

**Акрис® 1,5 л/га + никосульфурон 40-60 г д.в./га в фазу 2-5 листьев кукурузы**

**Акрис® 1,5 л/га + римсульфурон 10-12 г д.в./га в фазу 2-5 листьев кукурузы**

Акрис® смешивается с гербицидами на основе действующих веществ топрамезон, бромоксинил, мезотрион, никосульфурон, римсульфурон, форамсульфурон, йодсульфурон, дикамба, тритосульфурон, однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на совместимость.

## Регламент применения

| Культура                   | Норма расхода, л/га | Вредный объект                   | Способ, время обработки, ограничения                                                                                                     | Срок ожидания (кратность обработки) |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Кукуруза (не более 3 л/га) | 2,0-3,0             | Однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание посевов до всходов культуры                                                                                                 | — (1)                               |
|                            | 1,5                 |                                  | Двукратное опрыскивание: первое – после посева до всходов культуры: второе – в фазу 2-3 листа культуры (в ранние фазы развития сорняков) | — (2)                               |
| Сорго                      | 2,0-2,5             |                                  | Опрыскивание посевов до всходов культуры                                                                                                 | — (1)                               |
| Подсолнечник               | 2,0-2,5             |                                  | Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры                                                                                      | — (1)                               |
| Картофель                  | 2,5                 |                                  | Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры                                                                                     | — (1)                               |