

ГИБКИЙ — широкое “окно” применения Бутизан® Авант

Возможные сроки применения

- сразу после посева рапса;
- через 3-7 суток после посева рапса (почвенное применение до всходов сорной растительности);
- после всходов культуры, когда сорняки находятся в фазе семядолей (страховое применение по всходам сорной растительности);
- применение в баковой смеси со страховым гербицидом партнером в фазу 2-4 листа культуры для усиления гербицидного действия последнего.

БЕЗОПАСНЫЙ — высокая селективность Бутизан® Авант к культуре

Бутизан® Авант, в отличие от других гербицидов не содержит действующие вещества, вызывающие фитотокс и задержку развития культуры, например, кломазон и др. Это исключает риск повреждения посевов рапса и последующей гибели культуры во время перезимовки. Бутизан® Авант не вызывает обесцвечивания рапса (побеление листьев), независимо от типа, влажности и структуры почвы. Бутизан® Авант полностью безопасен для рапса в любой срок применения.

Бутизан® Авант не представляет опасности для последующих культур в севообороте.


В случае гибели посевов рапса, после вспашки на глубину 15-20 см, весной можно выращивать: яровую пшеницу, яровой ячмень, горох, кормовые бобы и яровой рапс. В случае гибели посевов озимого рапса осенью озимые зерновые можно посеять в конце сентября, сделав вспашку глубиной около 15-20 см.

Под понятием Комби-Эффект гербицида Бутизан® Авант скрываются улучшенные технологические свойства препарата для нивелирования неблагоприятных условий во время применения:

- ❶ Быстрая полевая активация (создание почвенного экрана при минимальном количестве влаги – от 6 мм осадков и более).
- ❷ Надежное уничтожение всходов сорной растительности на разной глубине их прорастания, за счет «вертикального» перераспределения компонентов препарата в почве.
- ❸ Длительность действия независимо от грануло-метрического состава почв, за счет сочетания 3-х компонентов и контроля нескольких волн сорной растительности.
- ❹ Нивелирование ограничений агротехники благодаря «горизонтальному» распределению в почвенном профиле, экранированному растительными остатками (соломой), комками почвы (плохая подготовка почвы) и/или листьями рапса.
- ❺ Полный контроль классического набора сорняков + эталон в контроле видов герани.
- ❻ Универсальность в сроках применения, обусловленная высокой селективностью препарата.

Бутизан® Авант

Тройное действие на сорняки с максимально длительной защитой даже в условиях перепада влажности почв




Наши контакты

www.agro-by.bASF.com




Регламент применения

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработки)
Рапс яровой и озимый	1,5–2,0	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30 (1)
Рапс яровой и озимый	1,5–2,0	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (семядольные листья)	




Более длительное действие и более низкая чувствительность по сравнению с классическими почвенными гербицидами



ЭФФЕКТИВНЫЙ — широкий спектр действия и длительная защита

Свойства трех действующих веществ в Бутизан® Авант дополняют друг друга, обеспечивая высокую эффективность. Диметенамид-П подавляет сорняки, которые всходят позже в сезоне, и проникает в глубокие слои почвы, в то время как метазахлор действует на поверхности почвы. Квинмерак усиливает эффект Бутизан® Авант на сорные растения. Благодаря трем компонентам Бутизан® Авант перемещается в почвенном профиле и проявляет более длительный гербицидный эффект даже при ограниченной влажности.



Бутизан® Авант создает надежный почвенный экран и эффективно защищает посевы рапса даже при широкорядном способе посева



Рапс, обработанный Бутизан® Авант через 50 суток после внесения



Бутизан® Авант (2,0 л/га) подавляет прорастающие сорняки



Благодаря Комби-Эффекту
Бутизан® Авант эффективен даже при наличии растительных остатков на поле